Esquema de vacunación recomendado 2026

Para mamás, papás y cuidadores de niños desde el nacimiento hasta la adolescencia

Este es el esquema que recomendamos en la clínica. Está basado en el de la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES) y actualizado con el esquema nacional 2026 del Ministerio de Salud. Lleve el carné de vacunas a cada consulta para revisar qué le toca a su hijo.

De recién nacido a 4 años

Edad	Vacuna	Dosis
Recién nacido	Hepatitis B[1]	Dosis única
	BCG (tuberculosis)[2]	Dosis única
2 meses	Hexavalente acelular[3]	1.ª dosis
	Neumococo conjugada 20 valente[4]	1.ª dosis
	Rotavirus[5]	1.ª dosis
4 meses	Hexavalente acelular[3]	2.ª dosis
	Neumococo conjugada 20 valente[4]	2.ª dosis
	Rotavirus[5]	2.ª dosis
6 meses	Hexavalente acelular[3]	3.ª dosis
	Neumococo conjugada 20 valente[4]	3.ª dosis
	Influenza tetravalente[6]	1.ª dosis
7 meses	Influenza tetravalente[6]	2.ª dosis
12 meses	Triple viral SPR (sarampión, paperas y rubéola)[7]	1.ª dosis
	Neumococo conjugada 20 valente[4]	Refuerzo
15 meses	Hepatitis A[8]	1.ª dosis
	Varicela[9]	1.ª dosis
18 meses	Hexavalente acelular[3]	Refuerzo
	Triple viral SPR[7]	2.ª dosis
2 años	Hepatitis A[8]	2.ª dosis
4 años	Refuerzo acelular: hexavalente, pentavalente o tetravalente[10]	Refuerzo
	Varicela[9]	2.ª dosis
Cada año desde los 6 meses	Influenza tetravalente[6]	1 dosis al año

De 9 años en adelante

Edad	Vacuna	Dosis
9 a 14 años	Virus del papiloma humano (VPH) 9 valente, niñas y niños[11]	2 dosis
11 a 12 años	Tdap (difteria, tétanos y tosferina)[12]	Refuerzo
	Meningococo conjugada ACWY[13]	1.ª dosis
15 años en adelante	VPH 9 valente, si no se vacunó antes[11]	3 dosis
16 años	Meningococo conjugada ACWY[13]	Refuerzo
Cada 10 años	Tdap o Td[12]	Refuerzo

Dr. Rafael Oscar Santamaría Vásquez · Pediatra e infectólogo · JVPM 16935 · NUE Infectología (CONADEM): INFECT-002-1
Hospital Centro Pediátrico, Clínica 7, Final Diagonal Dr. Luis Edmundo Vásquez #222, Colonia Médica, San Salvador
Lun. a vie. 1:00 a 5:30 p. m. · Sáb. 8:30 a. m. a 12:30 md · Previa cita · Tel. 2530 2083 · WhatsApp 7151 3283 · IG @dr.rafaelsantamaria

¿Se atrasó una vacuna? No hay que empezar de nuevo. El esquema se continúa donde quedó. Escríbanos y revisamos el carné de su hijo.

Vacunas en el embarazo

Virus sincitial respiratorio (VSR)
1 dosis entre las 28 y 36 semanas de embarazo. Protege al bebé contra la bronquiolitis y la neumonía por VSR en sus primeros 6 meses.

Tdap
1 dosis en cada embarazo, desde las 20 semanas. Protege al bebé contra la tosferina antes de que pueda vacunarse.

Influenza
En cualquier momento del embarazo, idealmente en el primer control.

Notas

1. **Hepatitis B:** en las primeras 24 horas de vida.
2. **BCG:** idealmente al nacer; se puede aplicar hasta los 11 meses. No se aplica si se sospecha que el bebé tiene defensas bajas.
3. **Hexavalente acelular:** protege contra difteria, tétanos, tosferina, polio, hepatitis B y *Haemophilus influenzae* tipo b.
4. **Neumococo:** protege contra meningitis, neumonía y otitis causadas por esta bacteria.
5. **Rotavirus:** son 2 dosis que se dan por la boca. La segunda dosis debe aplicarse antes de las 24 semanas de vida.
6. **Influenza:** los niños de 6 meses a 8 años que se vacunan por primera vez necesitan 2 dosis separadas por 4 semanas. Después, 1 dosis cada año.
7. **SPR:** en situaciones epidemiológicas especiales, como brotes de sarampión o viajes, se puede aplicar una dosis 0 desde los 6 meses. Esa dosis no cuenta en el esquema regular. No se aplica en el embarazo ni en personas con defensas bajas.
8. **Hepatitis A:** son 2 dosis, a los 15 meses y a los 2 años. Si se atrasó, se puede aplicar a cualquier edad, con 6 meses entre dosis.
9. **Varicela:** son 2 dosis, a los 15 meses y a los 4 años. Si no se aplicó en la infancia, se puede aplicar después. No se aplica en el embarazo ni en personas con defensas bajas.
10. **Refuerzo de los 4 años:** se puede aplicar entre los 4 y 6 años. Si no hay pentavalente, se puede usar hexavalente.
11. **VPH 9 valente:** de 9 a 14 años son 2 dosis separadas por 6 meses; si la segunda se aplica antes de los 6 meses, se necesita una tercera. Desde los 15 años son 3 dosis (0, 2 y 6 meses). Se puede aplicar hasta los 45 años.
12. **Tdap:** después de los 11 años se repite cada 10 años. En el embarazo se aplica en cada embarazo desde las 20 semanas.
13. **Meningococo:** si la primera dosis se aplica después de los 16 años, es dosis única. Desde los 9 meses se aplica a niños con riesgo; de 9 a 23 meses son 2 dosis separadas por 3 meses. Las personas sin bazo, con VIH u otras inmunodeficiencias necesitan refuerzo cada 5 años.

Esta información es educativa y no reemplaza la consulta médica. Si su hijo tiene dificultad para respirar, está muy decaído, no quiere tomar líquidos o tiene fiebre y es menor de 3 meses, busque atención de emergencia.

Fuentes: Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES). *Esquema de vacunación recomendado*. 2022. Ministerio de Salud de El Salvador. *Esquema de vacunación 2026*. CDC. *Child and Adolescent Immunization Schedule*.

Dr. Rafael Oscar Santamaría Vásquez · Pediatra e infectólogo · JVPM 16935 · NUE Infectología (CONADEM): INFECT-002-1
Hospital Centro Pediátrico, Clínica 7, Final Diagonal Dr. Luis Edmundo Vásquez #222, Colonia Médica, San Salvador
Lun. a vie. 1:00 a 5:30 p. m. · Sáb. 8:30 a. m. a 12:30 md · Previa cita · Tel. 2530 2083 · WhatsApp 7151 3283 · IG @dr.rafaelsantamaria